

اطلاعات تخصصی تینا‌پگ

TINAPEG نام تجاری Pegfilgrastim گزینه ای در درمان بلند مدت G-CSF است. برای تولید TINAPEG یک مولکول ۲۰ کیلودالتون monomethoxypolyethylene glycol به صورت کوالانسی به رزیدوی متیونیل از انتهای N-terminal پروتئین فیلگراستیم، با ۱۷۵ اسید آمینه و وزن مولکولی در حدود ۱۹۰۰۰ دالتون، متصل میشود که در سرنگ های یکبار مصرف حاوی ۶ میلی گرم در حجم کامل ۰.۶ میلی لیتر آماده مصرف میباشد.

موارد مصرف:

تینا‌پگ برای کاهش احتمال بروز عفونت (تب نوتروپنی)، در بیمارانی که تحت شیمی درمانی و پرتودرمانی سرکوب کننده مغز استخوان قرار می گیرند و ریسک ابتلا به تب نوتروپنی در آنها بالا می باشد، مورد استفاده قرار میگیرد.

موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت به پگ فیلگراستیم، فیلگراستیم یا سایر اجزای تشکیل دهنده فرمولاسیون، داروی تینا‌پگ نباید مصرف شود. همچنین یکسری بیماریها و داروها با پگ فیلگراستیم تداخل دارد که حتما پزشک خود را آگاه سازید.

عوارض ناخواسته دارو:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمیشود.

در صورت بروز عوارض زیر با داروساز یا پزشک خود مشورت نمائید: درد استخوان ، سردرد ، درد عضلانی ، دردمفصل ، اسهال، ریزش مو، حالت تهوع و استفراغ.

شرایط نگهداری:

دارو باید در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد در یخچال نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود.

در صورت یخ زدگی، فقط یک بار می توان دارو را با قرار دادن در یخچال یخ زدایی و مورد استفاده قرارداد.

اگر دارو بیش از یکبار یخ زده است، باید دور انداخته شود.

دارو در جعبه اصلی و دور از نور نگهداری شود و از تکان دادن دارو اجتناب شود.

از مصرف دارو هایی که بیش از ۴۸ ساعت در دمای اتاق مانده اند، خودداری شود.

به هیچ عنوان از داروی تاریخ گذشته استفاده نگردد. در صورت مشاهده تغییر رنگ، ذره یا کدورت از مصرف فرآورده خودداری نمایید.

در جای امن و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.