

روش تجویز تینا پگ به صورت زیر جلدی است.

روش صحیح تزریق زیرجلدی:

۱ - انتخاب محل تزریق و قرار دادن یخ در محل تزریق به منظور کاهش درد (قسمت بیرونی بازو، شکم با محدوده پنج سانتی متری ناف، قسمت بالای باسن، قسمت میانی یا جلویی ران)

۲ - به منظور کاهش درد قرار دادن سرنگ آماده تزریق در دمای اتاق ۳۰ دقیقه قبل از تزریق

۳ - شستن دست ها و محل تزریق با آب گرم و صابون

۴ - تمیز کردن محل تزریق با پنبه

۵ - خارج کردن سرنگ از بسته بندی و محفظه پلاستیکی و بررسی ظاهری سرنگ از نظر ترک،

شکستگی و عدم وجود درپوش سرنگ

۶ - برداشتن درپوش پلاستیکی

۷ - خارج کردن حباب های هوای سرنگ (خودداری از تکان دادن سرنگ)

۸ - بالا آوردن پوست با یک دست

۹ - گرفتن سرنگ آماده با دست دیگر و وارد کردن سرنگ به داخل پوست با زاویه ۹۰ یا

۴۵ درجه و تزریق آن با سرعت ثابت